

Rivastigmine 4,6, 9,5 en 13,3 mg/24 uur pleister voor transdermaal gebruik

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN PATIËNTENDAGBOEK

Deze informatie is belangrijk voor een veilig en effectief gebruik van de rivastigmine pleister

Rivastigmine 4,6 en 9,5 mg/24u

Gebruiksaanwijzing^{1, 2}






- Deze gebruiksaanwijzing en registratieblad medicatie zijn essentieel om het veilig en effectief gebruik van rivastigmine te verzekeren.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Belangrijk om te onthouden

- Verwijder de vorige pleister voordat u één nieuwe pleister aanbrengt.
- Plak slechts één pleister per dag.
- Knip de pleister niet in stukken.
- Druk de pleister met de handpalm gedurende ten minste 30 seconden stevig vast op zijn plaats.

Hoe brengt u de pleister aan?

1. Verwijder de oude pleister voorzichtig voordat u één nieuwe pleister aanbrengt.
2. Haal de nieuwe pleister uit de sachet en verwijder de bescherm laag van de bovenste, huidkleurige zijde van de pleister en gooi het weg.
3. Trek één kant van de beschermstrook van de pleister los.
4. Plak de pleister op de boven- of onderrug, bovenarm of borstkas en trek de beschermstrook los.
5. Druk de pleister gedurende ten minste 30 seconden stevig vast op zijn plaats.




Waar brengt u de pleister aan?

Verwijder de vorige pleister voordat u één nieuwe pleister aanbrengt.


Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de volgende aangegeven zones (zie plaatje hieronder).

U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Voorzijde:



Achterzijde:



Referenties:

1. rivastigmine transdermale pleister, bijsluiter.
2. rivastigmine transdermale pleister, SmPC.


REGISTRATIEBLAD MEDICATIE1,2

Hoe gebruikt u dit registratieblad?

- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een pleister aanbrengt en verwijdert.
- Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de letter van de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister


Voorzijde:



Breng iedere dag **één** nieuwe pleister aan in **één** van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Achterzijde:



Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht
<input checked="" type="checkbox"/>	11 Nov 12	Sunday	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

References:

1. rivastigmine transdermale pleister, bijsluiter.
1. rivastigmine transdermale pleister, SmPC.

Rivastigmine 13,3 mg/24u

Gebruiksaanwijzing^{1, 2}




- Deze gebruiksaanwijzing en registratieblad medicatie zijn essentieel om het veilig en effectief gebruik van rivastigmine te verzekeren.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Belangrijk om te onthouden

- Verwijder de vorige pleister voordat u één nieuwe pleister aanbrengt.
- Plak slechts één pleister per dag.
- Knip de pleister niet in stukken.
- Druk de pleister met de handpalm gedurende ten minste 30 seconden stevig vast op zijn plaats.

Hoe brengt u de pleister aan?

1. Verwijder de oude pleister voorzichtig voordat u één nieuwe pleister aanbrengt.
2. Haal de nieuwe pleister uit de sachet.
3. Trek één kant van de beschermstrook van de pleister los.
4. Plak de pleister op de boven- of onderrug, bovenarm of borstkas en trek de beschermstrook los.
5. Druk de pleister gedurende ten minste 30 seconden stevig vast op zijn plaats.




Waar brengt u de pleister aan?

Verwijder de vorige pleister voordat u één nieuwe pleister aanbrengt.


Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de volgende aangegeven zones (zie plaatje hieronder).

U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Voorzijde:



Achterzijde:



Referenties:

1. rivastigmine transdermale pleister, bijsluiter.
2. rivastigmine transdermale pleister, SmPC.


REGISTRATIEBLAD MEDICATIE1,2

Hoe gebruikt u dit registratieblad?


- Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een pleister aanbrengt en verwijdert.
- Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft.
- Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe pleister aanbrengt.
- Noteer de letter van de zone waarin u de nieuwe pleister heeft aangebracht.
- Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiters die bij het geneesmiddel zit.
- Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zones voor aanbrengen van de pleister

Voorzijde:



Achterzijde:



Breng iedere dag **één** nieuwe pleister aan in **één** van de zones die links staan weergegeven.

U kunt dezelfde zone gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde zone.

Oude pleister verwijderd?	Datum van aanbrengen nieuwe pleister	Dag van aanbrengen nieuwe pleister	Zone waarin de nieuwe pleister is aangebracht
<input checked="" type="checkbox"/>	11 Nov 12	Sunday	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

References:

1. rivastigmine transdermale pleister, bijsluiter.
1. rivastigmine transdermale pleister, SmPC.